

Infeksi Kulit Pada Pediatri

dr. IGA Agung Dwi Karmila, Sp.KK(K)

Infeksi Kulit Pada Pediatri

- BAKTERI:
 - Impetigo
 - Folikulitis
 - Furunkel
- JAMUR SUPERFISIAL:
 - Tinea kapitis
 - Pitiriasis Versikolor
- VIRUS:
 - Varicella
 - Moloskum contagiosum
 - HFMD
- PARASIT:
 - Skabies

IMPETIGO

- ♦ Etiologi: Bakteri kokus gram positif
- ♦ Klinis: Impetigo Krustosa
 - Jarang disertai demam
 - >> anak
 - Predileksi di muka, sekitar lubang hidung & mulut
 - Eritema & vesikel yg cepat memecah tampak krusta tebal berwarna kuning seperti madu, tampak erosi jika dilepaskan



Impetigo

- ◆ Klinis: Impetigo Bulosa
 - Predileksi di ketiak, dada, punggung
 - Bula superfisial, yang pecah dalam 2 atau 3 hari dan terbentuk krusta kuning.
 - Bula hipopion
 - Penyembuhan tidak berbekas
 - Th/ Antibiotik topical jika diperlukan
diberikan juga AB sistemik
 - Edukasi



Folikulitis

- ◆ Definisi: peradangan folikel rambut
- ◆ Predileksi di tungkai bawah, kepala dengan efloresensi pustul yg eritematosa, dan di tengahnya terdapat rambut,pustule tersebar dan multipel
- ◆ Tx: AB topikal dan jika diperlukan AB sistemik
- ◆ Edukasi



Furunkel

- ◆ Definisi: radang folikel rambut dan jaringan sekitarnya
- ◆ Klinis:
 - Nyeri, bisa disertai demam
 - Predileksi: area garukan, aksila, bokong
 - Nodus eritematosa berbentuk kerucut, ditengahnya terdapat pustule
- ◆ Tx: AB sistemik





DERMATOFITOSIS Tinea Kapitis

- ◆ Tinea kapitis → infeksi jamur pada kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh spesies dermatofita.
- ◆ Prevalensi: anak usia 3 – 14 tahun
- ◆ Gejala klinis: alopecia, rambut rontok dan rambut patah, skuama, pustul



- ◆ Bentuk klinis:
 1. Grey patch ringworm
 2. Bentuk radang/kerion
 3. Black dot ringworm



Terapi topikal

- Selenium sulfida (1% dan 2,5%)
- Ketokonazole (2%)

Penggunaan: 2 - 4 kali/ minggu ~ 2-4 minggu.

Terapi oral: Griseofulvin 20-25 mg/kgBB

Pitiriasis Versikolor

- ◆ Pitiriasis versikolor → infeksi jamur superfisial (*Malassezia furfur*) pada kulit, berupa bercak berwarna putih sampai kecoklatan
- ◆ Klinis: makula hipopigmentasi - hiperpigmentasi, batas tegas, bentuk bulat, pada permukaan lesi terdapat skuama halus,
- ◆ Gatal bila berkeringat






Pitiriasis Versikolor

- ◆ Penatalaksanaan
 - Menghindari kelembaban kulit
 - Topikal:
 - derivat azol: mikonazol atau ketokonazol
 - Selenium sulfida




Varicella

- ◆ e/ *Varicella zoster virus*
- ◆ >> usia 3-6 thn
- ◆ Penularan: droplet, kontak langsung, transmisi fase *congenital* (*congenital varicella*, *neonatal varicella*)
- ◆ Klinis: jarang prodromal (2-3 hr sblm erupsi)
- ◆ Lesi awal makula, papul dan jadi vesikel → krusta



TERAPI

- ◆ Anak: hanya simtomatis atau asiklovir
20mg/kgBB/hari dosis terbagi




Moluskum Kontagiosum

- ◆ Infeksi virus jinak pada kulit dan membran mukosa
- ◆ *Etiologi* → *molluscum contagiosum virus*
- ◆ Penularan: kontak langsung atau fomites sbg perantara
- ◆ Lokasi (anak): muka, badan ekstremitas
- ◆ Prinsip therapi: mengeluarkan massa → mengandung molluscum body

- ◆ Papul berukuran 3-6mm jarang membesar sampai 3 cm
- ◆ Permukaan lesi halus, warna keperakan sampai kemerahan, btk spt kubah, sentral tdp umbilikasi





HFMD

- Etiologi: enterovirus
- Penularan: respiratory droplet, kontak erat dengan host yang terinfeksi, ataupun kontak tidak langsung
- Klinis:
 - Flu like syndrome
 - Susah makan pada anak ok ada sariawan
 - Lesi kemerahan atau bula di telapak kaki, telapak tangan yang bisa meluas ke siku, lutut atau bokong
- Th/ simptomatis



SKABIES

- ◆ Etiologi → Sarcoptes scabiei var hominis
- ◆ 4 tanda kardinal:
 - pruritus nokturnal
 - mengenai manusia secara berkelompok
 - terowongan/kunikulus pada tempat predileksi
 - menemukan tungau
- ◆ Lokasi predileksi:
 - stratum korneum yang tipis yaitu sela jari tangan, pergelangan tangan bag volar, ketiak, sekitar umbilikus, bokong, genitalia eksterna dan perut bagian bawah



PENATALAKSANAAN SKABIES

- ◆ ANTIHISTAMIN
- ◆ Permethrin 5%
- ◆ Gama Benzena Klorida →
 - efektif utk semua stadium
 - tidak dianjurkan anak <6 tahun
 - Riwayat wanita hamil Tidak dianjurkan
 - Pemberiannya cukup 1 kali.

TERIMA KASIH